

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ GRIPPALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Période du rapport : du 24 janvier au 30 janvier 2016 (semaine 4)

Sommaire

Au Nouveau-Brunswick, l'activité grippale reste faible durant la semaine 4

Nouveau- Brunswick:

- Il y a eu 6 détections positives de la grippe durant la semaine 4. À ce jour, cette saison, un total de 25 détections positives de la grippe ont été signalées, 14 virus A (non sous-typé), 4 virus de la grippe B, 1 virus de la grippe A (H3) et 6 virus de la grippe A (H1N1)pdm09.
- Il n'y a eu aucune hospitalisation associée à la grippe durant la semaine 4. À ce jour, cette saison, un total de 8 hospitalisations associées à la grippe ont été signalées au Nouveau-Brunswick.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal était 6,9 consultations sur 1000 visites, ce qui est en-dessous des taux prévus pour la semaine 4.
- Une nouvelle éclosion de syndrome grippal a été signalée dans une école de la région 7.

Canada:

- Dans l'ensemble, l'activité grippale saisonnière a augmenté par rapport à la semaine précédente. Les niveaux d'activité grippale demeurent bas mais le nombre de détections de cas de grippe a atteint les niveaux prévus pour ce temps de l'année.
- Une augmentation du nombre d'éclosions a été signalée et la majorité de ces éclosions étaient attribuables à la grippe A.
- Le virus de la grippe A(H1N1) est le sous-type de grippe le plus commun en circulation au Canada.
- Les souches grippales caractérisées cette saison par le Laboratoire national de microbiologie semblent correspondre aux souches vaccinales recommandées par l'OMS.
- 895 détections positives de la grippe ont été signalées durant la semaine 4, et la proportion des tests positifs pour l'influenza était de 16,0%.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal était de 35,9 consultations sur 1000 visites pour la semaine 4. Le taux de consultation le plus élevé était chez les personnes âgées de 0 à 4 ans.
- Caractérisation des souches grippales : Le laboratoire national de microbiologie a caractérisé les antigènes de 106 virus de grippe H3N2, tous correspondent à la souche du vaccin, 132 virus de grippe A (H1N1)pdm09 correspond à la souche du vaccin ainsi que 44 virus de la grippe B, tous correspondent à la souche du vaccin (quadrivalent).

International :

Grippe saisonnière :

- À l'échelle mondiale, des niveaux croissants d'activité grippale ont continué d'être signalés dans les zones tempérées de l'hémisphère nord et la grippe A (H1N1) pdm09 est le virus le plus détecté.

Virus respiratoires émergents :


- MERS CoV:
 - WHO: http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
 - CDC: <http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/>
- Grippe aviaire:
 - WHO: http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/fr/

1) Données provenant du laboratoire¹

- L'activité grippale reste faible.
- Six détections de la grippe ont été signalées durant la semaine 4.
- Depuis le début de la saison, 25 détections positives de la grippe ont été signalées, 4 virus de la grippe B, 14 virus de la grippe A (non sous-typé), 1 virus de la grippe A (H3) et 6 virus de la grippe A (H1N1)pdm09.

¹ Les échantillons de surveillance sont soumis par les praticiens recrutés par le Réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB). Ce réseau est composé de sites en salles d'urgence, en médecine familiale, dans les Premières Nations, dans un foyer de soins, dans les universités, et dans les centres de santé communautaire. Les spécimens diagnostiques sont soumis par les médecins en milieu hospitalier et communautaire. Les données de laboratoire relatives à l'influenza comprennent les résultats provenant de spécimens diagnostiques ainsi que de surveillance. Tous les échantillons sont analysés au moyen d'une épreuve de PCR, qui consiste en une méthode rapide de détection conçue pour la détection de toutes les variantes connues de l'influenza A et B. Tous les cas confirmés en laboratoire sont signalés pour la semaine durant laquelle la confirmation du laboratoire est obtenue.

Figure 1 : Nombre et pourcentage de spécimens positifs de grippe au Nouveau-Brunswick par semaine, jusqu'au 30 janvier 2016 (source des données : résultats du laboratoire Georges-Dumont).



Note: La plupart des spécimens Influenza A (non sous-typés) sont de la souche prédominante.

Tableau 1 : Résultats de tests positifs d'influenza, par région sanitaire, au Nouveau-Brunswick, pour la semaine de rapport, cumulatif pour la saison courante et la saison précédente. (source des données : résultats du laboratoire G. Dumont jusqu'au 30 janvier 2016)


| Zone | Période du rapport: Jan./24/2016–Jan./30/2016 | | | | | | Cumulatif: (saison 2015-2016) Août/30/2015 –Jan./30/2016 | | | | | Cumulatif: (saison 2014-2015) août/24/2014 – août/29/2015 | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------------|---------------------------------|------------|----------|---|-----------------|---------------------------------|------------|----------|--|-----------------|---------------------------------|------------|------------|
| | Niveau d'activité grippale ² | A | | | | B | A | | | | B | A | | | | B |
| | | A(H3) | (H1N1) pdm09 | Non sous- typé/ Autres | Total A | Total | A(H3) | (H1N1) pdm09 | Non sous- typé/ Autres | Total A | Total | A(H3) | (H1N1) pdm09 | Non sous- typé/ Autres | Total A | Total |
| Zone 1 | Activité sporadique | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 88 | 0 | 353 | 441 | 280 |
| Zone 2 | Aucune activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 69 | 88 | 58 |
| Zone 3 | Activité sporadique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 69 | 88 | 55 |
| Zone 4 | Aucune activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 | 0 | 31 | 87 | 27 |
| Zone 5 | Activité sporadique | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 22 | 2 |
| Zone 6 | Activité sporadique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 | 0 | 95 | 176 | 29 |
| Zone 7 | Aucune activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 | 36 | 19 |
| Total N.-B. | | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 21 | 4 | 283 | 0 | 655 | 938 | 470 |

² Définition des niveaux d'activité grippale: <http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-grippe/surveillance/season-definitions-saison-fra.php>

2) Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG)³

- Au cours de la semaine 4, le taux de consultations pour le syndrome grippal était 6,9 consultations sur 1000 visites, ce qui est en-dessous des taux prévus pour la semaine 4.
- Au cours de la semaine 4, le taux de participation des sentinelles était de 29%, pour les médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et pour le réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB).

Figure 2 : Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG) au Nouveau-Brunswick, par semaine de déclaration, saison 2015/16 comparée aux saisons précédentes*.



* Le taux moyen fut calculé à partir des données des saisons 1996/97 à 2014/15 et excluant la saison pandémique (2009-2010).

³ Un total de 28 sites de praticiens (16 médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et 12 sites provenant du RPSI-NB) ont été recrutés pour la saison 2015/2016 afin de signaler le nombre de patients présentant un SG par rapport au nombre total de consultations de patients durant une journée, et ce, une fois par semaine.

3) Syndrôme grippal (SG) et données relatives aux éclosions confirmées par le laboratoire :


Tableau 2 : Activité grippale/éclosions dans les foyers de soins et écoles du Nouveau-Brunswick pour la période du rapport, pour la saison courante et la saison précédente.

| | Période du rapport: Jan./24/2016–Jan./30/2016 | | | Nombre cumulatif d'éclosions saison 2015-2016 | Nombre cumulatif d'éclosions saison 2014-2015 |
|-------------|---|---|---|---|---|
| | Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans les foyers de soins* | Écoles signalant des éclosions de SG** | Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans d'autres établissements* | | |
| Zone 1 | 0 sur 13 | 0 sur 74 | 0 | 1 | 14 |
| Zone 2 | 0 sur 15 | 0 sur 81 | 0 | 0 | 15 |
| Zone 3 | 0 sur 14 | 0 sur 95 | 0 | 0 | 12 |
| Zone 4 | 0 sur 6 | 0 sur 22 | 0 | 0 | 6 |
| Zone 5 | 0 sur 2 | 0 sur 18 | 0 | 0 | 4 |
| Zone 6 | 0 sur 9 | 0 sur 35 | 0 | 3 | 5 |
| Zone 7 | 0 sur 4 | 1 sur 27 | 0 | 3 | 8 |
| Total N.-B. | 0 sur 63 | 1 sur 352 | 0 | 7 | 64 |

*Au moins deux cas de SG en sept jours et au moins un cas d'influenza confirmé en laboratoire. Les éclosions sont signalées pour la semaine où l'on obtient une confirmation par le laboratoire.


**Un taux d'absentéisme de plus de 10 % et ce, apparemment attribuable au SG.

Figure 3 : Nombre d'éclosions de grippe (foyers de soins, hôpitaux et autres établissements) et d'éclosions de syndrome grippal (écoles) déclarées à la Santé publique au Nouveau-Brunswick, par semaine de rapport, saison 2015/16.



4) Surveillance⁴ des hospitalisations⁵ et décès⁶ associés à la grippe :

Figure 4: Hospitalisations et admissions aux soins intensifs associées à la grippe au Nouveau-Brunswick, par semaine d'hospitalisation, pour la saison courante et la saison précédente.*



*Ceux qui ont été hospitalisés 15 jours ou plus avant la date de confirmation de laboratoire ont été exclus du graphique.

**Vingt-six décès ont été signalés durant la saison 2014-2015.

Programme national de surveillance de l'influenza (FluWatch) – Pour un complément d'information sur l'activité grippale au Canada et dans le monde, consultez le site Web de l'Agence de santé publique du Canada à : <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php>

Autres liens :

Mondial- http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html

Europe: http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.aspx

PAHO: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

Australie: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm>

Nouvelle- Zélande: http://www.surv.esr.cri.nz/virology/influenza_weekly_update.php

Argentine: <http://www.msal.gov.ar/>

Afrique du sud: <http://www.nicd.ac.za/>

États-Unis: www.cdc.gov/flu/weekly/

Préparé par l'Unité de contrôle des maladies transmissibles, Bureau du médecin-hygiéniste en chef, tél.506-444-3044

⁴ Au début de janvier 2014, le bureau du médecin-hygiéniste en chef a mis en œuvre un nouveau système provincial de surveillance en collaboration avec les régions régionales de la santé afin de surveiller les hospitalisations associées à la grippe, les admissions aux soins intensifs et les décès.

⁵ Les hospitalisations (y compris les admissions aux soins intensifs) sont associées à la grippe, ils peuvent ou non être dû à la grippe.

⁶ Les décès sont associés à la grippe, la grippe peut être ou non la cause directe de la mort.