

Rapport sur l'immunisation dans les garderies, au moment de l'entrée à l'école et en milieu scolaire

Données sur l'année scolaire 2015-2016

Table des matières

Liste d'abréviations	0
1. Introduction.....	1
2. Source de données.....	1
3. Limites	2
4. Garderies – Preuve d'immunisation.....	3
4.1 Contexte.....	3
4.2 Récapitulatif, 2015-2016.....	3
5. Enfants satisfaisant aux exigences en matière d'immunisation pour l'entrée à l'école, 2015-2016	4
5.1 Contexte.....	4
5.2 Constatations générales.....	5
5.3 Constatations selon le vaccin administré, 2015-2016	5
6. Programmes d'immunisation en milieu scolaire.....	8
6.1 Contexte.....	8
6.2 Récapitulatif : vaccin anti-VPH 2015-2016.....	8
6.3 Récapitulatif : Vaccin dcaT 2015-2016.....	10
6.4 Récapitulatif : Vaccins Men-C-ACYW-135, 2015-2016.....	12
6.5 Récapitulatif : vaccin contre la varicelle, 2015-2016	14
Annexes	16
Annexe 1 : Calendrier d'immunisation systématique du Nouveau-Brunswick.....	16
Annexe 2 : Exigence d'immunisation pour l'entrée à la maternelle au Nouveau-Brunswick	17
Annexe 3 : Historique du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick	18

Liste des abréviations

Abréviation	Définition du terme
RRS	Régies régionales de la santé
N.-B.	Nouveau-Brunswick
SPSC	Système de prestation de services aux clients
Men-C-C	Vaccin conjugué contre le méningocoque du sérotype C
Men-C-ACYW-135	Vaccin conjugué contre le méningocoque des sérotypes A, C, Y et W-135
ROR	Rougeole, Oreillons, Rubéole
VPI	Virus polio inactivé
DCaT/dcaT	Diphthérie, tétanos, antioquelucheux acellulaire, tétanos
VPH	Virus du papillome humain

1. Introduction

Le présent rapport résume les statistiques relatives à la participation au programme d'immunisation dans les garderies, au moment de l'entrée à l'école et en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick. Il présente les données sur l'immunisation des enfants qui fréquentent la garderie, qui font leur entrée à l'école et qui sont vaccinés dans le cadre des programmes d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick de l'année scolaire 2015-2016¹. Les taux de couverture constituent des mesures importantes du succès des programmes d'immunisation, et servent d'indicateurs en ce qui concerne le niveau de protection à l'échelle de la population contre les maladies pouvant être prévenues par un vaccin. Même si ce rapport ne fournit pas les taux de couverture, en partie en raison de l'absence de registre provincial de vaccination, il vise à diffuser les données existantes en matière d'immunisation, qui éclaireront la planification et l'évaluation des programmes.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick soutient financièrement les programmes d'immunisation qui offrent une protection contre plusieurs maladies pouvant être prévenues par un vaccin (voir l'annexe 1 : Calendrier d'immunisation du Nouveau-Brunswick).

Un réseau de vaccinateurs comprenant des médecins, des pharmaciens, des infirmières praticiennes et des infirmières se chargent d'administrer les vaccins financés par les fonds publics. Les services de santé publique dans les régions régionales de la santé (RRS) collaborent avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance pour assurer le respect des lois et offrir des séances de vaccination en milieu scolaire. Les partenaires en immunisation du Nouveau-Brunswick travaillent ensemble afin d'accroître les niveaux de couverture vaccinale et d'offrir un programme d'immunisation de qualité.

2. Source de données

Les données résumées dans le présent rapport ont été recueillies auprès des RRS au moyen d'un système provincial de déclaration qui comportait des données régionales globales, y compris un numérateur et un dénominateur (p. ex. le nombre d'élèves inscrits selon l'année ou évalués dans les garderies). Ces données sont recueillies afin d'éclairer les politiques et les programmes d'immunisation régionaux et provinciaux.

Pour obtenir de plus amples précisions au sujet des éléments de données, des procédures ou des politiques, veuillez consulter le Guide du programme d'immunisation du Nouveau-Brunswick².

¹ Les données sur les années scolaires précédentes (de 2012-2013 à 2014-2015) sont accessibles en ligne à l'adresse http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/Rapport_immunisation_regionale_SP_2015.pdf

² http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html

Données relatives à la preuve d'immunisation dans les garderies

- Les données comprennent le nombre total de « nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire » (enfants de 0 à 4 ou 5 ans) qui fréquentent une garderie agréée, qui répondent ou non aux exigences de la *Loi sur la santé publique*, et les motifs pour lesquels les exigences n'ont pas été remplies.
- L'indicateur principal est une estimation du pourcentage de nourrissons et d'enfants d'âge préscolaire qui répondent aux exigences en matière d'immunisation pendant une année civile dans les garderies agréées.

Données sur les exigences d'immunisation pour l'admission à l'école

- Les données comprennent le nombre total d'enfants inscrits à la maternelle (âgés de 4 ou 5 ans, mais qui allaient avoir 5 ans le 31 décembre de l'année civile), qui répondent ou non aux exigences de la *Loi sur la santé publique*, et les motifs pour lesquels les exigences n'ont pas été remplies.
- L'indicateur principal est une estimation du nombre d'enfants inscrits à la maternelle qui répondent aux exigences en matière d'immunisation lorsqu'ils font leur entrée à l'école.

Données sur l'immunisation en milieu scolaire

- Les données comprennent le nombre total d'enfants dans une année scolaire visée par un programme de vaccination de santé publique en milieu scolaire, les élèves qui ont reçu les doses complètes de vaccin requises ou une vaccination incomplète ou qui n'ont pas été vaccinés, et les motifs pour lesquels les exigences n'ont pas été remplies.
- L'indicateur principal est le nombre d'enfants de l'année précise qui ont reçu un vaccin ou une série de vaccins particuliers pendant l'année scolaire.

3. Limites

Le présent rapport n'inclut pas les taux de couverture vaccinale selon le vaccin, l'âge et d'autres catégories³. Les statistiques ou les estimations relatives à la couverture vaccinale seraient fondées sur des données exactes, complètes et raisonnablement à jour sur l'immunisation provenant de tous les fournisseurs pour la population d'intérêt (p. ex. le registre de vaccination). À l'heure actuelle, le Nouveau-Brunswick ne dispose pas d'un registre d'immunisation complet, et il n'est donc pas possible de recenser avec exactitude les personnes immunisées ni d'obtenir un tableau de la couverture vaccinale de la population à l'échelle provinciale. Certains éléments des dossiers d'immunisation sont enregistrés dans différents systèmes, mais ceux-ci ne sont pas encore intégrés. En raison de ces facteurs d'inefficacité, nous avons dû recueillir l'information pour la production du présent rapport à partir de données régionales.

Les données concernant les garderies et l'entrée à l'école s'appliquent aux enfants possédant une preuve d'immunisation, c'est-à-dire un dossier de vaccination à jour en fonction de l'âge de l'enfant, présenté par

³ À une exception près : les statistiques sur le VPH peuvent donner une idée du taux de couverture si les estimations de population sont utilisées pour le dénominateur du groupe d'âge d'intérêt. Le numérateur est probablement une très bonne estimation de la valeur réelle de la population, car il n'y a qu'un seul vaccinateur (la santé publique), et tous les dossiers sont enregistrés dans le Système de prestation de services aux clients (SPSC) et résumés dans les tableurs de l'école.

les parents ou le tuteur. Des dossiers incomplets (c.-à-d. des dossiers qui ne sont pas à jour compte tenu de l'âge de l'enfant) ne veulent pas nécessairement dire qu'un vaccin n'a pas été administré; il se pourrait simplement que l'on n'ait pas de dossier à jour. De la même manière, l'absence d'un dossier ne signifie pas qu'un enfant n'a pas été vacciné : il se pourrait que les parents n'aient pas présenté le dossier ou qu'ils l'aient égaré. Un dossier égaré peut être difficile à remplacer, car il y a un coût associé au remplacement et, dans certains cas, le dossier n'est plus accessible.

Les données contenues dans le présent rapport résument les données complètes et exactes disponibles concernant les programmes d'immunisation de santé publique, y compris les preuves d'immunisation des enfants qui fréquentent les garderies, les exigences en matière d'immunisation de l'entrée à l'école et les programmes d'immunisation en milieu scolaire.

4. Garderies – Preuve d'immunisation

4.1 Contexte

Le *Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement, 2009-136* de la *Loi sur la santé publique* énonce que tous les enfants qui fréquentent une garderie agréée doivent fournir une preuve d'immunisation contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, méningite à méningocoques, *Haemophilus influenza* de type B et infection à pneumocoques.

Les exploitants de garderies doivent s'assurer que les enfants qui fréquentent une garderie ont une preuve d'immunisation contre les maladies précisées ou un document faisant état d'une exemption ou d'une objection. Les RRS ont la responsabilité de s'assurer que la population de la région géographique qu'elles desservent est immunisée de manière optimale. Les infirmières et infirmiers de la santé publique vérifient le respect des règlements de la *Loi sur la santé publique* et offrent des possibilités de vaccination de rattrapage aux enfants qui ne répondent pas aux exigences en matière de vaccination selon leur âge.


En ce qui concerne les données sur les garderies, l'information sur l'état vaccinal est limitée, car la population des garderies est composée de différents groupes d'âge, et les exigences de vaccination varient en fonction du groupe d'âge. Par conséquent, ces données ne doivent pas être utilisées en dehors de ce contexte, car elles ne représentent pas le taux de couverture ou de protection en garderie.

4.2 Récapitulatif, 2015-2016

- Au cours de l'année scolaire 2015-2016, des infirmières et des infirmiers de la santé publique ont visité un total de 368 garderies agréées dans toute la province; 10 364 nourrissons et enfants d'âge préscolaire (c.-à-d. enfants âgés d'au plus 4 ou 5 ans) devaient fournir une preuve d'immunisation.
- Au total, 45,2 % des enfants qui fréquentaient une garderie agréée répondaient aux exigences d'immunisation. En moyenne, 2,1 % des enfants avaient présenté une exemption médicale ou un formulaire d'objection signé par les parents ou le tuteur légal; 12,5 % des enfants n'avaient aucune preuve d'immunisation, et 52,7 % n'avaient aucune preuve qu'ils étaient à jour dans leur dossier d'immunisation.

- Les zones présentant les pourcentages les plus élevés d'enfants répondant aux exigences d'immunisation étaient, par ordre décroissant : Z4 (77,9 %), Z5 (59,6 %), Z6 (53,4 %), Z7 (46,1 %), Z1 (44,5 %), Z2 (38,2 %), Z3 (37,6 %)
- Parmi les différents groupes d'âge, les enfants de moins de 12 mois comptaient le pourcentage le plus élevé de ceux répondant aux exigences en matière d'immunisation (61 %), suivis des enfants âgés de 18 mois à moins de 4 ans (60,2 %), puis les enfants entre 12 mois et moins de 18 mois (45,5 %), les enfants d'âge préscolaire (4 ans et plus) se trouvaient au dernier rang, et 27,6 % d'entre eux étaient à jour.

Graphique 1. Pourcentage d'enfants répondant ou ne répondant pas aux exigences d'immunisation pour la fréquentation d'une garderie au Nouveau-Brunswick, par groupe d'âge, 2015-2016.



5. Enfants satisfaisant aux exigences en matière d'immunisation pour l'entrée à l'école, 2015-2016

5.1 Contexte

Le fait de devoir fournir une preuve de l'immunisation est une exigence en place depuis 1982 pour les enfants qui entrent à l'école au Nouveau-Brunswick. Différentes exigences en matière d'immunisation ont été adoptées au fil des ans (voir l'annexe 2. Historique des exigences en matière d'immunisation pour l'entrée à l'école).

Le *Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement, 2009-136* de la *Loi sur la santé publique* énonce que tous les enfants qui entrent à l'école au Nouveau-Brunswick doivent fournir une preuve d'immunisation contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, et méningite à méningocoques, conformément au calendrier d'immunisation du Nouveau-Brunswick.

Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance collabore avec les régies régionales de la santé afin de s'assurer que tous les enfants qui entrent à l'école pour la première fois au Nouveau-

Brunswick présentent une preuve d'immunisation. Bien qu'une preuve d'immunisation soit exigée pour tous les enfants qui entrent à l'école pour la première fois au Nouveau-Brunswick, seules les statistiques relatives à la maternelle sont présentées chaque année au Bureau du médecin-hygiéniste en chef.


5.2 Constatations générales

- En 2015-2016, 78,4 % des enfants qui ont fait leur entrée à la maternelle répondaient aux exigences en matière d'immunisation. Il s'agissait d'un pourcentage nettement supérieur à celui de l'année scolaire précédente, où seuls 69,1 % répondaient à l'exigence.
- La plupart des zones ont connu une augmentation du pourcentage d'élèves qui satisfont aux exigences en matière d'immunisation par rapport à l'année précédente. La zone où le taux de variation était le plus élevé était la zone 3 (+23,3 %), suivie de la zone 1 (+11,7 %).
- Les objections parentales ont globalement légèrement diminué en 2015-2016 (2,3 %) par rapport à 2014-2015 (2,8 %). La zone 4 comptait encore le pourcentage le plus élevé d'objections parentales parmi les autres zones, soit 8,5 % des parents ou tuteurs qui ont refusé de faire immuniser leurs enfants.
- Aucun dossier d'immunisation n'a été remis pour 4 % des enfants entrant à la maternelle.

5.3 Constatations selon le vaccin administré, 2015-2016

- Chez les élèves qui ont présenté une preuve d'immunisation, les vaccins associés au pourcentage le plus élevé d'élèves ayant un dossier d'immunisation à jour, pour l'ensemble de la province, étaient, par ordre décroissant : Men-C-C (91 %), ROR (90,4 %), varicelle (88,5 %), VPI (80,8 %) et DCaT (80,6 %).
- Les pourcentages d'élèves ayant un dossier d'immunisation à jour étaient supérieurs ou semblables à la moyenne provinciale dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7 pour chacun des vaccins tandis qu'ils étaient inférieurs à la moyenne provinciale dans les zones 1 et 2 pour certains vaccins.

Graphique 2. Pourcentage d'élèves répondant aux exigences en matière d'immunisation ou en vertu d'une exemption médicale ou d'une objection, ou ne répondant pas aux exigences, Nouveau-Brunswick, de 2014-2015 à 2015-2016



Graphique 3. Pourcentage d'élèves répondant aux exigences en matière d'immunisation pour l'entrée à l'école, par zone de santé, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016





Figure 1. Pourcentages d'élèves à jour en matière d'immunisation, selon le vaccin administré, par zone de santé comparativement à la moyenne provinciale, 2015-2016



6. Programmes d'immunisation en milieu scolaire

6.1 Contexte


Les programmes d'immunisation en milieu scolaire sont essentiels pour prolonger la durée de protection contre un certain nombre de maladies infantiles et pour assurer une protection contre d'autres infections pouvant survenir plus tard dans la vie (p. ex. virus du papillome humain). L'immunisation en milieu scolaire est plus efficace pour obtenir des taux de couverture plus élevés que les autres formes d'immunisation. En collaboration avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, les infirmières et infirmiers de la santé publique ont mis en œuvre avec succès de nombreux nouveaux programmes d'immunisation en milieu scolaire dans l'ensemble de la province. En outre, des programmes d'immunisation de rattrapage ont permis aux membres d'autres groupes d'âge de se faire vacciner dans le cadre de campagnes de vaccination. Les RRS offrent également des occasions pour les élèves de mettre à jour leur dossier d'immunisation systématique. Voir l'annexe 3 pour un historique des programmes d'immunisation en milieu scolaire du Nouveau-Brunswick.

6.2 Récapitulatif : vaccin anti-VPH 2015-2016


L'année scolaire 2015-2016 est la première année de la mise en œuvre d'une série vaccinale contre le virus du papillome humain comportant deux doses, alors qu'auparavant, une série vaccinale de trois doses était adoptée. Par conséquent, la définition d'une vaccination incomplète en 2015-2016 (c.-à-d. recevoir une dose de vaccin) sera différente par rapport aux années précédentes (recevoir une ou deux doses de vaccin).

- En 2015-2016, un plus grand nombre de filles ont reçu la série complète de vaccins contre le VPH (75,4 %) par rapport à 73,5 % en 2014-2015. On attribue la majorité de la hausse du pourcentage de vaccination complète en 2015-2016 à la diminution du taux de filles ayant reçu une série vaccinale incomplète comparativement à 2014-2015.
- La plupart des zones ont connu une hausse du pourcentage de la série complète de vaccins à l'exception des zones 4, 6 et 7 où le pourcentage a diminué.
- Les zones présentant les pourcentages les plus élevés d'élèves ayant reçu la série complète du vaccin étaient, par ordre décroissant : Z5 (89,3 %), Z7 (81,3 %), Z6 (80,2 %), Z1 (76,3 %), Z3 (74,4 %), Z4 (72,7 %) et Z2 (71,0 %).
- Le pourcentage d'élèves non immunisées correspondait à celui de 2014-2015.
- Parmi les enfants non immunisés (n = 765), 70 % n'ont pas fourni de raison parce qu'ils ont soumis un formulaire de consentement, mais n'ont pas indiqué de raison (35 %) ou qu'ils n'ont pas remis le formulaire de consentement (35 %); 6 % ont fourni des raisons d'ordre religieux ou moral; 6 % craignaient des effets indésirables; 3 % ne pensaient pas avoir besoin du vaccin; 2 % ne se sont pas présentés au rendez-vous malgré le consentement, et 12 % ont invoqué d'« autres raisons ».
- Au total, 125 élèves n'ont pas reçu la série complète du vaccin (ont uniquement reçu une dose) : de ce nombre, 54 % ne se sont pas présentés au rendez-vous malgré le consentement; 39 % ont invoqué d'« autres raisons », et 7 % ont retiré leur consentement.

Graphique 4. Pourcentage de filles ayant reçu la série complète ou incomplète de doses du vaccin anti-VPH, ou non immunisées, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016




Graphique 5. Pourcentage de filles ayant reçu la série complète de doses du vaccin anti-VPH, par zone de santé, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016




Graphique 6. Raisons invoquées par les filles de 7^e année pour refuser la vaccination ou pour ne pas recevoir toute la série de doses du vaccin anti-VPH, Nouveau-Brunswick, 2015-2016

A- Raisons du refus de l'immunisation (N = 765)




B- Raisons d'une série vaccinale incomplète (N = 125)




6.3 Récapitulatif : Vaccin dcaT 2015-2016

- Le pourcentage d'élèves immunisés par le vaccin dcaT était semblable à celui de l'année scolaire précédente, soit 83,2 %. La plupart des élèves ont été vaccinés pendant l'année scolaire, les autres l'étaient déjà.
- Le pourcentage d'élèves immunisés a augmenté dans les Z1, Z2 et Z3, est resté stable dans la Z5 et a diminué dans les Z4, Z6 et Z7 en 2015-2016 par rapport à 2014-2015.
- Les zones présentant les pourcentages les plus élevés d'enfants immunisés étaient, par ordre décroissant : Z6 (91 %), Z7 (88,7 %), Z5 (88 %), Z1 (87,5 %), Z4 (82,2 %), Z2 (78,7 %) et Z3 (78,4 %).
- Parmi les élèves non immunisés (n = 1 243), 73,7 % n'ont pas fourni de raison parce qu'ils ont soumis un formulaire de consentement, mais n'ont pas indiqué de raison (21 %) ou qu'ils n'ont pas remis le formulaire de consentement (52,7 %); 6,1 % ne se sont pas présentés au rendez-vous; 3,8 % ne pensaient pas avoir besoin du vaccin, car ils avaient reçu un nombre suffisant de doses (la majorité a eu la dernière dose avant l'âge de 11 ans, ce qui n'est pas une dose valide pour un adolescent); 2,6 % ont fourni des raisons d'ordre religieux ou moral et les 13,1 % qui restent ont invoqué d'« autres raisons », notamment les effets indésirables.


Graphique 7. Pourcentage des élèves immunisés par le vaccin dcaT à l'école, déjà immunisés, ou non immunisés, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016.



Graphique 8. Pourcentage des élèves immunisés par le vaccin dcaT (à l'école ou déjà immunisés), par zone de santé, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016.




Graphique 9. Raisons invoquées par les élèves de 7^e année pour refuser le vaccin dcaT, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 (N = 1 318)




6.4 Récapitulatif : Vaccins Men-C-ACYW-135, 2015-2016

- Le pourcentage d'élèves immunisés a diminué en 2015-2016 par rapport à l'année scolaire précédente, soit 72,7 % ayant reçu le vaccin Men-C-ACYW-135. La plupart des élèves ont été vaccinés pendant l'année scolaire, les autres l'étaient déjà.
- Les zones présentant les pourcentages les plus élevés d'élèves immunisés étaient, par ordre décroissant : Z7 (86,9 %), Z5 (85,3 %), Z6 (80,4 %), Z4 (76 %), Z2 (74,1 %), Z1 (71,5 %) et Z3 (63,9 %).
- Parmi les élèves non immunisés (n = 2 123), 82 % n'ont pas fourni de raison parce qu'ils ont soumis un formulaire de consentement, mais n'ont pas indiqué de raison (11 %) ou qu'ils n'ont pas remis le formulaire de consentement (71 %); 10 % ne se sont pas présentés au rendez-vous; 2 % ont fourni des raisons d'ordre religieux ou moral, et les 6,2 % qui restent ont invoqué d'« autres raisons », notamment les effets indésirables.


Graphique 10. Pourcentage des élèves immunisés par le vaccin Men-C-ACYW-135 à l'école, déjà immunisés, ou non immunisés, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016



Graphique 11. Pourcentage des élèves immunisés par le vaccin Men-C-ACYW-135 à l'école ou immunisés antérieurement, par zone de santé, Nouveau-Brunswick, 2014-2015 et 2015-2016




Graphique 12. Raisons invoquées par les élèves de 9^e année pour refuser le vaccin Men-C-ACYW-135, Nouveau-Brunswick, 2015-2016 (N = 2 123)




6.5 Récapitulatif : vaccin contre la varicelle, 2015-2016

- L'immunisation de rattrapage contre la varicelle a été amorcée en 2015-2016 pour les élèves des 9^e et 10^e années et se poursuivra pour les élèves de la 9^e année uniquement jusqu'en 2022-2023.
- Au total, 58,9 % de tous les élèves des 9^e et 10^e années étaient immunisés contre la varicelle : la plupart de ces élèves ont été vaccinés pendant l'année scolaire, les autres l'étaient déjà ou avaient déjà eu la maladie.
- La participation des élèves de la 9^e année était supérieure à celles des élèves de la 10^e année (45 % et 31.1 % respectivement).
- Les zones présentant les pourcentages les plus élevés d'élèves immunisés étaient, par ordre décroissant : Z7 (76,8 %), Z5 (70,8 %), Z2 (65,3 %), Z6 (62,5 %), Z1 (58,2 %), Z3 (51,4 %) et Z4 (39 %).
- Parmi les élèves non immunisés (n = 6 241), 83,7 % n'ont pas fourni de raison parce qu'ils ont soumis un formulaire de consentement, mais n'ont pas indiqué de raison (8,2 %) ou qu'ils n'ont pas remis le formulaire de consentement (75,5 %); 5 % ne se sont pas présentés au rendez-vous; 0,8 % ont fourni des raisons d'ordre religieux ou moral, et les 10,4 % qui restent ont invoqué d'« autres raisons ».


Graphique 13. Pourcentage des élèves de 9^e et 10^e années ayant reçu le vaccin contre la varicelle à l'école, ayant déjà reçu le vaccin ou attrapé la maladie ou non vaccinés, Nouveau-Brunswick, 2015-2016.



Graphique 14. Pourcentage des élèves (9^e et 10^e années combinées) ayant reçu le vaccin contre la varicelle à l'école, ayant déjà reçu le vaccin ou attrapé la maladie, par zone de santé, Nouveau-Brunswick, 2015-2016.



Graphique 15. Raisons invoquées par les élèves de 9^e et 10^e année (combinaées) pour refuser le vaccin contre la varicelle, Nouveau-Brunswick, 2015-2016 (n = 6 241)



Annexes

Annexe 1 : Calendrier d'immunisation systématique du Nouveau-Brunswick



Calendrier d'immunisation systématique

Le calendrier d'immunisation systématique du Nouveau-Brunswick est établi par le médecin-hygiéniste en chef. Les vaccins recommandés au calendrier d'immunisation systématique sont fournis par la Santé publique et d'autres fournisseurs de soins de santé au Nouveau-Brunswick. L'immunisation en temps opportun et selon le calendrier d'immunisation, est la meilleure protection contre les maladies pouvant être prévenues par un vaccin.

Calendrier d'immunisation systématique des enfants	
Âge ou année scolaire	Vaccin
Naissance	Hépatite B
Deux mois	Hépatite B DCaT-VPI-Hib ¹ Pneumocoque conjugué
Quatre mois	DCaT-VPI-Hib Pneumocoque conjugué
Six mois	Hépatite B DCaT-VPI-Hib
12 mois	RORV Méningocoque conjugué C Pneumocoque conjugué
18 mois	DCaT-VPI-Hib RORV
De six mois à 18 ans	Influenza (annuellement)
4 ans	DCaT-VPI ou dcaT-VPI ³
7 ^e année scolaire	VPH ⁴ (filles seulement) + dcaT ⁵
9 ^e année scolaire	Méningocoque conjugué ACYW-135

Campagne d'immunisation visant des groupes cibles ou campagne de rattrapage pour les adolescents nés entre 2000 et 2008			
Année scolaire	Vaccin	Date de début	Date de fin
9 & 10	deuxième dose Varicelle	Année scolaire 2015-16	Année scolaire 2015-16
9	deuxième dose Varicelle	Année scolaire 2016-17	Année scolaire 2022-23

Calendrier d'immunisation systématique des adultes	
Âge	Vaccin
Age adulte	Le vaccin dT6 devrait être administré tous les dix ans. Le vaccin dcaT devrait remplacer une des doses dT.
≥65 ans	Pneumocoque polysaccharidique
65 ans et plus	Influenza (annuellement)
Les adultes nés après 1970 devraient communiquer avec leur fournisseur de soins de santé ou le bureau de la Santé publique pour obtenir des renseignements sur le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.	
Le vaccin antigrippal est recommandé pour tous les Néo-Brunswickois de six mois et plus. Il est fourni gratuitement à ceux qui présentent des risques élevés de complications dues à la grippe, y compris les personnes âgées de 65 ans et plus. Pour obtenir davantage de renseignements relatifs à d'autres personnes admissibles au programme d'immunisation antigrippale financée par l'État, consultez votre fournisseur de soins de santé ou communiquez avec le bureau de la Santé publique.	

¹ DCaT-VPI-Hib : diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, virus de la polio inactivé, haemophilus influenzae de type b

² RORV : rougeole, oreillons, rubéole, varicelle

³ DCaT-VPI ou dcaT-VPI : diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, virus de la polio inactivé

⁴ VPH : virus du papillome humain

⁵ dcaT : diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos

dT : tétanos et diphtérie

Annexe 2 : Exigence d'immunisation pour l'entrée à la maternelle au Nouveau-Brunswick

Le dossier d'immunisation des enfants est considéré à jour pour l'admission à l'école (maternelle) si le nombre total de doses de vaccin valides et obligatoires a été administré en fonction de leur âge et contre les maladies mentionnées dans le *Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement, 2009-136* de la *Loi sur la santé publique*.

Dose valide : Une dose est jugée valide si elle est administrée à l'âge recommandé (ou à l'âge minimum acceptable pour la dose), dans l'intervalle de temps recommandé (ou le délai minimum acceptable à partir de l'administration de la dernière dose) et si le délai recommandé entre l'administration de produits sanguins et l'administration d'un vaccin vivant atténué est respecté.

Nombre total de doses de vaccin requises par antigène (série complète) :

- **Avant 2010-2011** : rougeole (1 dose), oreillons (1 dose), rubéole (1 dose), diphtérie (3 doses), tétanos (3 doses) et poliomyélite (3 doses);
- **Pour les années 2010-2011 à 2013-2014** : rougeole (2 doses), oreillons (2 doses), rubéole (2 doses), diphtérie (5 doses), coqueluche (5 doses), tétanos (5 doses), poliomyélite (4 doses), varicelle (1 dose) et vaccin antiméningococcique (1 dose);
- **À partir de 2014-2015** : rougeole (2 doses), oreillons (2 doses), rubéole (2 doses), diphtérie (5 doses), coqueluche (5 doses), tétanos (5 doses), poliomyélite (4 doses), varicelle (2 doses) et vaccin antiméningococcique (1 dose).

Remarque : Les enfants qui n'ont pas commencé le calendrier d'immunisation systématique dans la petite enfance (retard dans le calendrier) suivent un calendrier d'immunisation différent et peuvent être considérés « à jour » avec un nombre inférieur de doses conformément au *Guide canadien d'immunisation*⁴. Exemple : Si la quatrième dose de DCaT est administrée après le 4^e anniversaire de naissance, il n'est pas nécessaire d'en administrer une cinquième.

⁴ <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-canadien-immunisation.html>

Annexe 3 : Historique du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick

Tableau 1. Historique du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick – vaccin dcaT, juin 2016

	Année scolaire											
	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
6 ^e année												
7 ^e année												
8 ^e année												
9 ^e année												
10 ^e année												
11 ^e année												
12 ^e année												
	Calendrier d'immunisation systématique											
	Campagne d'immunisation ciblée/de rattrapage											
	Campagne d'immunisation en cas d'épidémie											

Résumé

- **2003 et avant** : un vaccin contre le tétanos et la diphtérie (dT) était offert aux élèves de la 11^e année dans le cadre du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick.
- **2004-2005** : un vaccin combiné contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire (dcaT) a remplacé le vaccin dT. Le vaccin de rappel dcaT a été déplacé de la 11^e année à la 9^e année, et un programme d'immunisation de rattrapage visait les élèves des 10^e et 11^e années.
- **2005-2006** : le vaccin dcaT était offert aux élèves de la 9^e année.
- **2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009** : le vaccin dcaT était offert aux élèves de la 6^e année dans le cadre d'un programme triennal d'immunisation de rattrapage. Le vaccin était également offert aux élèves de la 9^e année.
- **2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012** : l'administration du vaccin dcaT aux élèves de la 9^e année a été suspendue en raison de l'achèvement d'un programme triennal de rattrapage au niveau de la 6^e année.
- **Printemps 2012** : de mai à la mi-juin 2012, une campagne de vaccination en milieu scolaire s'est tenue pour prévenir la progression continue de la coqueluche chez les enfants d'âge scolaire. Les élèves de 6^e, 7^e et 8^e années dans les régions les plus touchées (zones de santé 1 et 2) ont reçu le vaccin dcaT.
- **2012-2013** : Les élèves de 7^e, 8^e et 9^e années dans les régions moins touchées (zones de santé 3, 4, 5, 6 et 7) se sont vu offrir la vaccination à l'automne 2012. La dose de rappel dcaT pour adolescents a été réintroduite en 7^e année (plutôt qu'en 9^e année), et un programme d'immunisation de rattrapage visait les élèves de 8^e et 9^e années.
- **À partir de 2013-2014** : La dose de rappel dcaT pour adolescents est proposée aux élèves de 7^e année uniquement.

Tableau 2. Historique du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick – vaccin anti-VPH, juin 2016

	Année scolaire											
	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
5 ^e année												
6 ^e année												
7 ^e année						*						
8 ^e année							*					
9 ^e année												
10 ^e année												
11 ^e année												
12 ^e année												
	Calendrier d'immunisation systématique											
	Campagne d'immunisation ciblée/de rattrapage											
	Campagne d'immunisation en cas d'épidémie											

Résumé

- **2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013** : une série de trois doses du vaccin quadrivalent contre le virus du papillome humain (VPH4) était offerte aux filles de la 7^e année dans le cadre du programme d'immunisation en milieu scolaire du Nouveau-Brunswick. On a également proposé le vaccin aux filles de 8^e année dans le cadre d'un programme d'immunisation de rattrapage de 1 an.
- ***2009-2010** : l'administration du vaccin VPH4 a été retardée dans certaines régions de la province en raison de la campagne de vaccination massive contre la grippe H1N1.
- ***2010-2011** : le vaccin VPH4 était offert aux filles de la 8^e année lorsque la campagne de vaccination contre le virus H1N1 avait causé des retards (programme de rattrapage).
- ***2015-2016** : Une série de deux doses du vaccin quadrivalent contre le virus du papillome humain (VPH4) est offerte aux filles de 7^e année dans le cadre du programme d'immunisation en milieu scolaire du Nouveau-Brunswick.

Tableau 3. Historique du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick – vaccin antiméningococcique, juin 2016

	Année scolaire											
	2004/ 2005	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016
5 ^e année	*											
6 ^e année	*											
7 ^e année	*											
8 ^e année	*											
9 ^e année												
10 ^e année	*											
11 ^e année	*											
12 ^e année	*											
	Men-C-C (2004-2005 – 2005-2006)			Men-C-ACYW-135 (2007-2008 – 2012-2013)								
	Calendrier d'immunisation systématique											
	Campagne d'immunisation ciblée/de rattrapage											
	Campagne d'immunisation en cas d'épidémie											

Résumé

- **2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007** : un vaccin conjugué contre le méningocoque de groupe C (Men-C-C) était offert aux élèves de la 9^e année dans le cadre du programme d'immunisation en milieu scolaire du Nouveau-Brunswick.
- **2005** : *une campagne de vaccination massive a été mise en œuvre de mai à juin 2005 dans les comtés de Westmorland, de Kent et d'Albert; 16 000 élèves de la 5^e année à la 12^e année et jeunes adultes, jusqu'à l'âge de 19 ans, se sont vu offrir un vaccin conjugué contre le méningocoque de groupe C (NeisVac-C).
- **2005-2006** : le vaccin conjugué contre le méningocoque de groupe C a été offert aux élèves de la 10^e année à la 12^e année dans d'autres régions de la province, dans le cadre d'un programme d'immunisation de rattrapage.
- **À partir de 2007-2008** : Le vaccin conjugué antiméningococcique monovalent (Men-C-C) a été remplacé par le vaccin antiméningococcique quadrivalent (Men-C-ACYW-135). Le vaccin Men-C-ACYW-135 a été proposé aux élèves de la 9^e année dans le cadre du programme d'immunisation en milieu scolaire du Nouveau-Brunswick.

Tableau 4. Historique du programme d'immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick – vaccin ROR, juin 2016

	Année scolaire										
	2004/ 2005*	2005/ 2006	2006/ 2007	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015
5 ^e année											
6 ^e année											
7 ^e année											
8 ^e année											
9 ^e année											
10 ^e année											
11 ^e année											
12 ^e année											
	Calendrier d'immunisation systématique										
	Campagne d'immunisation ciblée/de rattrapage										
	Campagne d'immunisation en cas d'épidémie										

Résumé

- **2007-2008** : un vaccin ROR était offert aux élèves de la 12^e année dans le cadre d'une intervention relative à une épidémie d'oreillons au Nouveau-Brunswick. On offrait une dose du vaccin ROR aux élèves qui n'avaient pas reçu deux doses auparavant.
- **2008-2009 – 2011-2012** : on offrait une seconde dose du vaccin ROR aux élèves de la 12^e année dans le cadre d'une campagne d'immunisation de rattrapage de six ans. Pendant l'année scolaire 2011-2012, on a offert le vaccin ROR aux élèves des 11^e et 12^e années. La campagne d'immunisation de rattrapage a pris fin un an plus tôt que prévu à cause d'une épidémie de rougeole au Québec et de l'augmentation du nombre de cas partout au Canada, aux États-Unis et en Europe.

*REMARQUE

On a également offert le vaccin ROR aux jeunes adultes âgés de 24 ans ou moins et aux étudiants de niveau postsecondaire nés en 1970 ou plus tard qui n'avaient pas reçu antérieurement deux doses du vaccin.

Tableau 5. Historique du programme d’immunisation en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick – plan de la campagne d’immunisation de rattrapage contre la varicelle, juin 2016

	Année scolaire							
	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
5 ^e année								
6 ^e année								
7 ^e année								
8 ^e année								
9 ^e année								
10 ^e année								
11 ^e année								
12 ^e année								
	Calendrier d’immunisation systématique							
	Campagne d’immunisation ciblée/de rattrapage							
	Campagne d’immunisation en cas d’épidémie							

Résumé

- Un programme de rattrapage de la deuxième dose du vaccin visant les élèves des 9^e et 10^e années a été lancé en 2015-2016.
- Le vaccin continuera d’être offert aux élèves de la 9^e année au cours des années scolaires 2016-2017 à 2022-2023.